

细小病毒造成严重脱水，并且杀死白血球。这会造
成免疫系统变弱，使狗更容易感染其它疾病。

细小病毒在幼犬中最为常见，但任何年龄的狗都
可能受到这种病毒影响

这种病毒还更可能对幼犬具有致命性，并可能造
成一窝生的所有幼犬死亡。

预防细小病毒

幼犬应该在以下年龄接种疫苗：


- 8 周
- 12 周
- 16 周
- 之后每年一次。


如果您的成年犬或幼犬未充分接种疫苗，您就应
该限制宠物与其它动物接触，并且避开狗可能接
触细小病毒的地方（如宠物狗公园、宠物商店、驯
练课等）。在此之前让宠物社交时，要确保其它动
物充分接种疫苗，这一点很重要。

成年狗 - 一年接种疫苗一次可以防止它们感染这
种病毒。您应该与兽医讨论狗的情况。



 rspcavic.org

 03 9224 2222

 3 Burwood Highway
Burwood East VIC 3151



皇家防止虐待动物协会
(维多利亚州) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761



细小病毒

一种严重的成年犬和幼犬疾病



细小病毒是一种严重疾病，这种疾病影响各个年龄未接种疫苗的狗。病毒很容易在狗与狗之间传播，并可能造成狗死亡。

狗的粪便（大便）是这种病毒最常见的来源，因此狗可能从土壤或其它狗感染这种病毒。这种病毒也可能通过接触其它的狗、脏污的鞋、衣物、床上用品、食盆、饮水盆和玩具传播。

在首次出现后，细小病毒可在家里、土壤和后院中存活数年。因此，要确保您的狗按时接种疫苗，让它们一直预防这种病毒，这一点非常关键。

细小病毒会侵害狗的胃肠道，并且损坏肠道内壁和骨髓。

症状

（注意：在一些狗中，以下症状可能不会全部都出现）：


- 呕吐
- 腹泻便血
- 不想吃东西
- 极度疲倦或虚弱
- 发烧

治疗

1. 如果您怀疑自己的狗感染细小病毒，就应该立即去看兽医。如果及早发现这种病毒，有时可以通过大量输液、抗生素和护理来治疗。不幸的是，许多狗 - 特别是幼犬 - 变得太过虚弱，无法挽救回来。请务必记住，这种病毒可迅速致死，您需要立即去看兽医。
2. 细小病毒可以通过粪便传播，并可以从土壤中传染，因此一定要在狗大便后拾起狗粪，这一点非常重要。如果社区中每个人都拾起狗粪，病毒传播的可能性就更低。
3. 对食盆、玩具、床上用品和笼子进行消毒和擦拭，可以清除环境中的病毒，防止传播给其它狗，这也非常重要。如果家中有多个宠物，建议最后再给对生病的宠物喂食和处理，并且注意避免交叉感染。

受到污染的表面可以使用兽医等级的消毒剂（如F10）或经过稀释的家用漂白水（1份漂白水兑30份水）清洁。这两种产品都应该留在硬质表面上10-15分钟。然后应该对经过消毒的表面进行冲洗或拭净，以免残留物给宠物造成任何问题。任何可能受到污染的软性材料都应该丢弃。草和土壤是无法充分清除的。

治疗



第1步

向兽医求助



第2步

消毒并擦拭表面

预防



第1步

接种疫苗



第1步

拾起狗粪